

Standard Dünndarmkapsel Endoskopie (Pill-Cam 3)

Vorbereitende Aufklärungen:

- Aufklärung (Aufklärungsbogen) Dünndarmkapsel Endoskopie
- Aufklärung ÖGD

Untersuchungsvorbereitung:

5 Tage vor der Untersuchung:

- Keine Eiseneinnahme, kein Barium, kein Sucralfat.

24 Stunden vor der Untersuchung:

- Kein Mesalazin Granulat, keine sonstigen Arzneimittel in Granulatform, keine Kerne

Am Vortag:

- Darmreinigung mit Moviprep (Split Dosis), keine zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme notwendig, jedoch erlaubt. Zwischen der Morgendosis Moviprep und der Applikation der Endokapsel sollte ein Zeitintervall von 2 Stunden liegen.
- am Untersuchungstag:
- Einnahme von 80 mg Simethicon 20 Minuten vor Kapsel Applikation

Kapsel Applikation:

- Endokapsel mit 200 ml stillem Wasser schlucken
- anschließend Trinken von warmem Pfefferminzetee
- zur Passagebeschleunigung Patienten nach Kapsel Applikation 2 Stunden spazieren gehen lassen
- nach 1 Stunde Kontrolle der Kapselposition über den Recorder Monitor
- alle 2 Stunden für 30 Minuten Kaugummi kauen (Studiendaten)

Nahrungsaufnahme:

- Nach 2 Stunden klare Flüssigkeit möglich
- nach 4 Stunden Brühe und Tabletten möglich
- nach 6 Stunden Verzehr normaler Nahrung möglich

Störquellen:

- Starke Magnetfelder (Induktionsherd)
- Funkquellen wie z. B. Garagentoröffner (Pill-Cam sendet auf 443 MHz)
- Geräteschäden durch den Patienten (selbständige Entfernung der Elektroden und des Aufzeichnungsgerätes), Abknicken der Kabel.